

## **FRUKTTRÆR – SKJØTSELGRUPPE E**

**Jord.**

**Trives best i dyp, moldholdig matjord.**

**Jo mer sol og varme, jo bedre blomstring, fruktsetting og frukt/bærkvalitet.**

### **GJØDSLING I ETABLERINGSPERIODEN.**

**Mengde pr. m<sup>2</sup>:**

**40-60 g klorfri fullgjødseI tidlig på våren og to overgjødslinger a 20-30 g kalksalpeter ( gjerne med bor) midt i juni og primo juli. Planter reagerer positivt på kugjødselkompost og annen tilsvarende organisk gjødseI som gir jevn gjødseIavgivning over tid. På ellers næringsfattig jord må det tilføres nitrogen i tillegg til den organiske gjødsla. Eventuell overgjødseI gis i forbindelse med nedbør eller vanning. Ved store nedbørmengder bør det ved siste gjødseI gis 20-30 g fullgjødseI i tillegg til kalksalpeter. Gi ikke gjødseI etter primo juli da dette kan påvirke overvintringsevnen. Brukes kompost eller organiske gjødseIslag, bør en gjødseI seint på høsten eller tidlig på våren så snart jorda er bekvem. Denne gjødseIinga har sein, men langvarig virkning.**

**Jorda kan etter hvert bli sur ( lav ph - verdi ). Dette retter en på ved å tilføre kalk i form av kalkdolomitt eller lignende om høsten.**

**Vanning**

**Som for gruppe B**

### **Klipping/Beskjæring.**

**Trærne er i utgangspunktet ferdig formet fra leverandør.**  
Svake og skadde greiner kan fjernes. Større inngrep i kronen bør utføres av sertifisert arborist.

**Toppskuddet bindes til en stakk i 2-3år.**