Mellbye

FRUKTTRÆR

SKJØTSELGRUPPE E

JORD	Trives best i dyp, moldholdig matjord. Jo mer sol og varme, jo bedre blomstring, fruktsetting og frukt/bærkvalitet.
GJØDSLING I ETABLERINGS-PERIODEN	Mengde pr. m2: 40-60 g klorfri fullgjødsel tidlig på våren og to overgjødslinger a 20 30 g kalksalpeter (gjerne med bor) midt i juni og primo juli. Planter reagerer positivt på kugjødselkompost og annen tilsvarende organisk gjødsel som gir jevn gjødselavgivning over tid. På ellers næringsfattig jord må det tilføres nitrogen i tillegg til den organiske gjødsla. Eventuell overgjødsling gis i forbindelse med nedbør eller vanning. Ved store nedbørmengder bør det ved siste gjødsling gis 20-30 g fullgjødsel i tillegg til kalksalpeter. Gi ikke gjødsel etter primo juli da dette kan påvirke overvintringsevnen. Brukes kompost eller organiske gjødselslag, bør en gjødsle seint på høsten eller tidlig på våren så snart jorda er bekvem. Denne gjødslinga har sein, men langvarig virkning. Jorda kan etter hvert bli sur (lav ph - verdi). Dette retter en på ved å tilføre kalk i form av kalkdolomitt eller lignende om høsten.

VANNING	Som for gruppe –B
KLIPPING / BESKJÆRING	Trærne er i utgangspunktet ferdig formet fra leverandør. Svake og skadde greiner kan fjernes. Større inngrep i kronen bør utføres av sertifisert arborist. Toppskuddet bindes til en stokk i 2-3år.