Mellbye

TRÆR

SKJØTSELGRUPPE C

JORD

Trær krever tilstrekkelige vekstmasser til rotvekst i mange år framover. Når vekstjorda er 'oppbrukt' kan treet stagnere og utvikling og treform blir ødelagt.

GJØDSLING

Bruk 30-50 gram klorfri fullgjødsel pr kvadratmeter plantefelt så snart snøen er borte.
På skarpe masser med stor utvasking, gjødsles det to ganger med samme mengde. Andre gjødsling etter 3-4 uker. Ekstra tilskudd av nitrogen kan gis i form av kalksalpeter, 20-30 gram pr kvadratmeter plantefelt, midt i juni. Ingen gjødsling etter 1.7. da dette kan forskyve avmodning utover høsten og gi frostskader.

Overgjødsling gjøres i forbindelse med vanning eller nedbør. Det må imidlertid ikke kastes gjødsel på fuktig bladverk da spesielt kalksalpeter kan gi sviskade på bladene. Ved ellers tilfredstillende verdier iflg. jordanalyser, kan gjødsel tilføres som organisk materiale eller annen langtidsvirkende gjødsel.

VANNING

Treet trenger følgende vekstfaktorer i prioritert rekkefølge. Luft-Vann-Næringsstoffer. Vanning som for Gruppe B. Se eget punkt om generell vanning.

KLIPPING / BESKJÆRING

Skadde og døde greiner fjernes ved klipping inn til greinkragen. Kryssende krongreiner som gnisser ved vind fjernes. Stammeskudd under kronen fjernes samme vekstsesong som de framkommer. Greiner med for spisse greinvinkler for sorten fjernes for å ummgå inngrodd bark.

Det bør tilstrebes at krontrær skal ha gjennomgående toppskudd. Hvis det etter leveranse oppstår konkurranseskudd i kronen, må disse fjernes. Krongreiner som vokser til en lengde som forstyrrer toppskuddet eller som på grunn av lengde i forhold til greintykkelse blir slengete må skjæres tilbake. Dette gjelder nesten alltid spisslønn.

Kronearbeid i vedlikeholdsperioden bør utføres av sertifisert arborist.